


D.C.D

ד"ר ענת פרישמן שטרית

ליקויים בתהליך הסנסורי

הקלסיפיקציה



בקונגרס בין לאומי בשנת 1994 מומחים
לדיספרקסיה הסכימו להכיל במושג אחד מכליל

Development Coordination Disorder (DCD)

חקר בתחום העלה כי אחוז הדיספרקסיה
באוכלוסיה הינו: כ- 5%-6% וכוללת קשת רחבה
של הפרעות

Coordination

העלולות לפגוע בתחום הלמידה, ההתנהגות,
התפקוד המוטורי והחברתי.

- לפני מתן האבחנה יש לשלול הפרעות ניורולוגיות שונות והפרעה התפתחותית נרחבת (PDD), במידה וקיים פיגור שכלי, יש לבדוק את איכות התאום והביצוע המוטורי בהתאם לגילו המטלי של הילד.

הגדרה

כל הזכויות שמורות לד"ר ענת פרישמן
שטרית

עקב ריבוי ההגדרות שנוצרו בשטח הכוללות:

באותה שנה הופיעה הדרה זו בספר האבחנות
הפסיכיאטריות D.S.M 4.

• D.C.D נגרם עקב נזק עצבי כלשהוא בזמן הלידה

או לאחריה היצר בלבול במערכת המעבירים או

הקולטנים במערכת העצבים הכללית.

אטיולוגיה

- D.C.D הינו ליקוי המופיע בילדות בדרך כלל
מזוהה בקרב ילדים בגילאים 6-12.

אפיונים פיזיים

מאפיינים עיקריים

- הימנעות מפעילויות מסוימות בשל חשש מכישלון.
- דימוי עצמי נמוך, סף תסכול נמוך, חרדה, העדר מוטיבציה או לחילופין התנהגות אימפולסיבית וחסרת גבולות.
- הימנעות מיצירת קשרים חברתיים עם קבוצת השווים, בעיקר בפעילויות בחצר.
- תחושת תסכול וחוסר שביעות רצון מהשגיו ביחס לבני גילו.

אפיונים רגשיים חברתיים

• התנגדות לשינויים בסביבה ובשגרת יומו של הילד.

גישות טיפול

כל הזכויות שמורות לד"ר ענת פרישמן
שטרית

.2 Top-down:

• תאור מקרה (ג)